EKSTRAK BIJI PETAI (*PARKIA SPESIOSA* HASSK) SEBAGAI HEPATOPROTEKTOR BERDASARKAN KADAR SGPT, SGOT DAN HISTOLOGI HATI TIKUS PUTIH JANTAN YANG DIINDUKSI CCL4

Sediarso¹⁾, Erwin Saputra²⁾, Kriana Efendi³⁾

^{1*)}Universitas MH Thamrin

²⁾Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
sediarso@yahoo.com

ABSTRAK

Biji petai (*Parkia speciosa* Hassk) diketahui mengandung zat antioksidan. Antioksidan bersifat dapat menangkap radikal bebas dan dapat digunakan sebagai hepatoprotektor. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas ekstrak biji petai sebagai hepatoprotektor. Pada penelitian ini digunakan tikus putih *Rattus norvegicus* sebanyak 6 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 ekor tikus. Kelompok pertama sebagai kontrol normal, kedua sebagai kontrol positif yang diberi obat pebanding kurliv plus, ketiga sebagai kontrol negatif, selanjutnya kelompok keempat, kelima dan keenam berturut-turut diberi ekstrak 50 mg/200 g BB (dosis 1), 100 mg/200 g BB (dosis 2), dan 200 mg/200 g BB (dosis 3). Perlakuan ini selama 7 hari, kemudian pada hari kedelapan diinduksi dengan karbon tetraklorida, dan pada hari kesembilan diambil darahnya untuk ditetapkan kadar SGPT dan SGOT serta dilakukan pembedahan untuk diukur diameter vena sentralisnya. Data yang didapat adalah kadar SGPT, SGOT dan diameter vena sentralis hati. Dari data yang didapat diuji secara statistik menggunakan uji anova dan dilanjutkan dengan uji Tukey HSD, hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak biji petai memiliki efektivitas sebagai hepatoprotektor pada dosis 200 mg/200 g BB (dosis 3) berdasarkan kadar SGPT, SGOT dan kerusakan vena sentralis hati. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak biji petai mempunyai efektivitas sebagai hepatoprotektor pada dosis 200 mg/200 g bb yang setara dengan obat pebanding kursiv plus.

Kata kunci : Biji Petai, SGPT dan SGOT, Histologi Hati

PENDAHULUAN

Hati merupakan organ yang cukup penting pada manusia. Hati memiliki berat sekitar 1,5 kg atau 2% dari berat badan normal. Hati terletak di bagian atas abdomen sebelah kanan di bawah diafragma (Baradero 2008). Fungsi hati antara lain sebagai alat sekresi, metabolisme, tempat penyimpanan seperti glikogen, lemak, serta zat besi yang disimpan sebagai ferritin, detoksifikasi, serta dapat membentuk dan menghancurkan sel darah merah selama 6 bulan masa kehidupan fetus yang kemudian diambil alih oleh sumsum tulang belakang (Setiadi 2007). Oleh karena itu hati harus di jaga kesehatannya agar terhindar kerusakan atau gangguan-gangguan hati seperti hepatitis, nekrosis hati, serosis hati, steatosis hati (perlemakan hati). Kerusakan-kerusakan hati ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain virus (hepatitis), mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, penggunaan obat-obatan hepatotoksik, serta paparan dari radikal bebas. Salah satu cara untuk memelihara kesehatan hati adalah dengan pemberian hepatoprotektor. Hepatoprotektor adalah suatu senyawa atau zat yang berkhasiat melindungi sel sekaligus memperbaiki jaringan hati yang rusak akibat pengaruh zat toksik. Mekanisme kerja dari hepatoprotektor adalah dengan mendetoksifikasi senyawa racun baik yang masuk dari luar maupun yang terbentuk di dalam tubuh (Hadi 2002). Hepatoprotektor yang baik adalah hepatoprotektor dari bahan alam. Salah satu tanaman yang diduga memiliki efektivitas sebagai hepatoprotektor adalah petai (*Parkia speciosa* Hassk).

Petai (*Parkia speciosa* Hassk) merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat tradisional yang sudah lama ditanam di Indonesia. Petai merupakan pohon tahunan tropika dari suku polong-polongan.

Secara tradisional biji petai digunakan untuk mengobati hipertensi, diabetes, ginjal serta mengandung mineral dan vitamin. Biji petai juga memiliki aktivitas sebagai antibakteri dan antikanker (Kamisah 2013). Biji petai ini memiliki beberapa kandungan antara lain senyawa polifenol, fitosterol dan flavonoid, yang memungkinkan adanya aktivitas antioksidan pada biji petai. Aktivitas antioksidan pada petai telah diuji sebelumnya secara *in vitro* yang menunjukkan adanya penghambatan oksidasi asam linoleat dengan persentase 47,55%; 61,58%; 73,04%; dan 81,69%, dengan konsentrasi ekstrak berturut-turut 0,02; 0,04; 0,06; dan 0,08 mg/mL (Pahalaning 2007). Antioksidan adalah zat yang memperlambat atau menghambat stress oksidatif pada molekul target (Priyanto 2015). Salah satu zat yang dapat menyebabkan stress oksidatif adalah Karbon tetraklorida (CCl_4).

Karbon tetraklorida (CCl_4) merupakan zat yang tidak berwarna, berbau seperti eter atau kloroform dan dapat dicampur dengan alkohol, dietileter, benzene serta tidak mudah terbakar, mempunyai titik didih 76-77 °C, dengan berat jenis 1,59 g/mL. Mekanisme kerusakan hati oleh CCl_4 adalah karbon tetraklorida yang masuk ke dalam hati menjadi radikal triklorometil (CCl_3) oleh sitokrom P-450 di retikulum endoplasma, CCl_3 ini akan bereaksi dengan O_2 menjadi CCl_3O_2 (trikloro metal peroksi) yang lebih reaktif. Perubahan kimia dalam membran sel dapat menyebabkan membran sel pecah, sehingga enzim-enzim yang berada di dalamnya keluar lalu masuk ke dalam pembuluh darah, yang dapat menyebabkan peningkatan enzim transaminase dalam darah. Kerusakan akut maksimum pada hati tercapai dalam waktu 24-48 jam (Klaseen 2007). Tanda kerusakan hati nampak jelas sebelum timbul efek pada ginjal. Walaupun berakibat fatal, tetapi lesi di hati tidak selalu mengakibatkan kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hepatoprotektor Ekstrak biji petai (*Parkia speciosa* Hassk). Parameter yang diamati adalah kadar SGPT dan SGOT serta histologi hati tikus. Dalam penelitian ini tikus akan diinduksi menggunakan CCl_4 , kemudian hasil kadar SGPT, SGOT, dan histologi hati akan dibandingkan dengan kontrol normal dan kontrol positif. Dasar pengujian ini adalah adanya antioksidan yang terkandung di dalam biji petai. Aktivitas antioksidan sebagai hepatoprotektor telah diuji sebelumnya pada tanaman yang berbeda, antara lain daun bakau api-api putih dengan konsentrasi 182 mg/kg (Hardiningtyas et al 2014), daun katuk (*Sauropus androgynous* L.) 800 mg/kg BB (Joniada 2011), dan daun lidah buaya (*Aloe vera* L.) 4000 mg/200 g BB (Kurniawan 2014). timbul efek pada ginjal. Walaupun berakibat fatal, tetapi lesi di hati tidak selalu mengakibatkan kematian.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2016 di Laboratorium Terpadu Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta dan Departemen Biologi Universitas Indonesia.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : satu set alat bedah, kandang tikus putih, masker, sarung tangan, timbangan hewan, timbangan analitik, *blender*, *hot plate*, *sonde*, jarum suntik, erlenmeyer, *beacker glass*, gelas ukur, spatula, batang pengaduk, kaca arloji, *rotary evaporator*, kapas, kertas saring, *termometer*, tabung reaksi, mikrotube, mikropipet, tabung EDTA, pipan kapiler, cawan penguap, desikator, *object glass*, *cover glass* dan *aluminium foil*, spektrofotometer klinikal. Bahan yang digunakan adalah biji petai

(*Parkia speciosa* Hassk), Kurliv Plus, HCl 2N, Aqua Destilata, larutan bouin, etelan, Pereaksi dragendort, Pereaksi Mayer, Metanol, HCl pekat, Mg, Etanol 70%, Eter, Asam Asetat Anhidrat, H₂SO₄ pekat, FeCl₃, NaCMC, CCl₄, Reagen kit SGOT-SGPT.

Prosedur Penelitian

Determinasi Tanaman

Bahan yang digunakan adalah Biji Petai diperoleh dari BALITRO, Bogor. Determinasi dilakukan di Herbarium Bogoriense Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi LIPI-Bogor.

Pembuatan Ekstrak Etanol 70% Biji Petai

Biji petai ditimbang sebanyak 1 kg lalu dibersihkan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering. Kemudian di serbuk dengan *blender*. Serbuk yang diperoleh diayak dengan pengayak mesh 40, kemudian ditimbang sebanyak 0,5 kg lalu disimpan dalam wadah bersih dan tertutup rapat. Simplisia biji petai diekstrak dengan cara maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70% ke dalam *erlenmeyer* selama 5 hari. *Erlenmeyer* kemudian ditutup kemudian sesekali diaduk. Campuran tersebut disaring dengan menggunakan kapas diatas corong sehingga didapatkan filtrat. Selanjutnya filtrat yang dihasilkan disaring kembali dengan kertas saring. Kemudian ampasnya dimaserasi kembali dengan menggunakan etanol sampai terlihat berwarna pucat. Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan dengan menggunakan *rotary evaporator*. Setelah diuapkan, ekstrak diuapkan dalam penangas air pada suhu 50°C sehingga diperoleh ekstrak biji petai kental.

Pemeriksaan Karakteristik Ekstrak Biji Petai

Pemeriksaan organoleptis

Pemeriksaan organoleptis meliputi pemeriksaan bentuk, warna, dan bau simplisia (Depkes RI 2000).

Susut Pengeringan

Pemeriksaan dilakukandengan alat *moisture balance*. Nyalakan *moisture balance* dan panaskan 10 menit. Setelah 10 menit atur alat dengan menekan menu, pilih metode yang akan digunakan. Masukkan ekstrak kental kedalam wadah sampel didalam *moisture balance* dan ratakan. Tutup *moisture balance* kemudian tunggu hingga lampu mati dan catat hasilnya. Lakukan sebanyak 3x percobaan, kemudian ukur rata- ratanya. Tunggu alat hingga suhu 30°C dan matikan alat.

Penapisan Fitokimia Ekstrak

Uji penapisan fitokimia yang diujikan yaitu kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, steroid dan triterpenoid, tanin (Depkes RI 1995).

Perhitungan Rendemen Ekstrak Biji Petai

Perhitungan rendemen dilakukan dengan menghitung jumlah ekstrak kering yang didapatkan kemudian dibagi dengan serbuk kering sebelum dilakukan ekstraksi, kemudian dikalikan 100% (Depkes RI 2000).

Penetapan Dosis

Pada penelitian ini dosis ekstrak biji petai yang digunakan 50 mg/200 g BB, 100 mg/200 g BB, 200 mg/200 g BB. Penentuan dosis ini berdasarkan pada hasil dari pengujian aktivitas antioksidan biji petai terhadap antiinflamasi dengan dosis efektif 100 mg/200 g BB (Tanjaya Arifin 2015).

Pembuatan Sediaan Uji

Pembuatan Na CMC 0,5%

Menurut Farmakope Indonesia edisi IV 1 g Na CMC larut dalam 50 mL air panas (Depkes RI 1995). Timbang 0,5 g Na CMC, taburkan diatas 100 mL air panas, setelah 15 menit aduk kuat-kuat dalam lumpang sampai terbentuk suspensi yang homogen.

Suspensi ekstrak Biji Petai

Masukkan ekstrak biji petai dan Na CMC ke dalam lumpang gerus sampai homogen, kemudian masukkan ke dalam labu ukur tambahkan NaCMC sampai volume yang diinginkan, kocok sampai homogen.

Perlakuan Terhadap Hewan Uji

Persiapan hewan uji

Hewan uji yang digunakan adalah tikus *Rattus norvegicus* putih jantan berumur 2-3 bulan dengan berat badan 200-300 gram. Hewan tersebut diaklimatisasi terlebih dahulu selama 7 hari agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan selama proses adaptasi dilakukan pengamatan kondisi umum serta dilakukan penimbangan berat badan setiap hari. Hewan uji yang sakit, dengan ciri-ciri aktivitas berkurang, lebih banyak diam, dan bulunya berdiri, tidak akan diikutsertakan dalam penelitian. Pengelompokan hewan uji yang sehat dilakukan sehari sebelum melaksanakan percobaan uji hepatoprotektor ekstrak biji petai.

Pengambilan Serum Darah

Pengambilan serum darah setelah perlakuan 8 hari diambil dari sinus orbital pada mata tikus menggunakan pipa kapiler pada hari ke-9, dimasukkan ke dalam tabung EDTA, dipindahkan ke dalam mikrotube, disentrifuge dengan kecepatan 4.500 rpm selama 15 menit sehingga didapatkan serum (bagian yang jernih) dari darah. Serum yang telah diperoleh diambil dengan menggunakan pipet *ependrof* kemudian dipisahkan ke tabung yang lain, untuk segera dilakukan pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT.

Pengukuran aktivitas SGOT dan SGPT

1) Pengukuran SGOT

Serum darah diambil 100 μ l dengan mikropipet, ditambahkan *reagen* SGOT BUF 1000 μ l, kemudian divortex, diinkubasi pada suhu 37°C selama 5 menit, kemudian ditambahkan *reagen* SGOT SUB 250 μ l, vortex dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 menit. Ukur serapan pada spektrofotometer klinik.

2) Pengukuran SGPT

Serum darah diambil 100 μ l dengan mikropipet, ditambahkan *reagen* SGPT BUF 1000 μ l, kemudian divortex, diinkubasi pada suhu 37°C selama 5 menit, kemudian ditambahkan *reagen* SGPT SUB 250 μ l, vortex dan di inkubasi pada suhu 37°C selama 1 menit. Ukur serapan pada spektrofotometer klinik

Analisis Data

Data yang telah terkumpulkan, diolah dengan menggunakan uji distribusi normal (uji *Kolmogorov-smirnov*), uji homogenitas (uji *levene*), lalu dilanjutkan dengan analisis varian satu arah (ANOVA) untuk mengetahui perbedaan yang ada, jika terdapat perbedaan dua perlakuan atau lebih (nilai sig. < 0.005) maka pengujian dilanjutkan dengan uji Tukey untuk mengetahui letak perbedaannya (Budi dan Ashari 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Determinasi

Biji petai dari tanaman petai diperoleh dari Blittro Bogor, dideterminasi di Herbarium Bogoriense, Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi LIPI Bogor. Hasilnya menunjukkan bahwa tanaman tersebut adalah *Parkia speciosa* Hassk yang termasuk ke dalam keluarga *Fabaceae / Leguminosae*

Hasil Ekstrak

Biji petai segar ditimbang 1 kg kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Biji petai yang telah kering dibuat menjadi serbuk untuk mempermudah proses ekstraksi dan diayak dengan ayakan mesh 40. Ditimbang serbuk biji petai 500 gram, dimasukkan ke dalam wadah maserasi tambahkan pelarut etanol 70% dengan perbandingan 1:10. Hasil maserasi dipekatkan dengan *rotary evaporator* hingga mendapat ekstrak kental. Dari hasil ekstraksi biji petai didapat data sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Ekstraksi Biji Petai

No	Jenis	Hasil
1	Biji petai segar	1 kg
2	Biji petai kering	0,89 kg
3	Serbuk biji petai	0,5 kg
4	Ekstrak biji petai	125, 69 gram

Hasil Karakteristik Ekstrak

Ekstrak kental yang didapat diuji karakteristiknya melalui uji organoleptis yang mencakup warna, bau, bentuk, dan rasa, kemudian perhitungan rendemen ekstrak dan kadar air yang terkandung didalam ekstrak dengan metode susut pengeringan. Dari hasil pengujian tersebut didapat data sebagai berikut:

Tabel 2.
Karakteristik Ekstrak Etanol Biji Petai

Organoleptis	Warna : hijau tua pekat
	Bau : khas
	Bentuk : kental
	Rasa : khas
% Rendemen	25,138%
Susut pengeringan	1,06 gram = 3,26%

Hasil Penapisan Fitokimia

Pada ekstrak dilakukan penapisan fitokimia yang meliputi uji alkaloid, saponin, steroid dan triterpenoid, serta tanin. Didapatkan hasil bahwa ekstrak mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, dan tidak mengandung terpenoid dan tannin. Berikut hasil penapisan fitokimia ekstrak biji petai.

Tabel 3.
Hasil Uji Penapisan Fitokimia Ekstrak Biji Petai

Kandungan	Ekstrak Etanol
Alkaloid	+
Flavonoid	+
Saponin	+
Steroid	+
Triterpenoid	-
Tanin	-

Hasil Uji Efektivitas Hepatoprotektor

Setelah hewan uji diberi ekstrak dan perlakuan sesuai dengan kelompok masing-masing selama 7 hari, kemudian hewan uji diinduksi dengan CCl₄ pada hari kedelapan dan dilakukan pengambilan darah pada hari kesembilan. Dari hasil pengujian yang dilakukan didapat hasil kadar SGPT dan SGOT tikus putih jantan sebagai berikut:

Tabel 4.
Rerata kadar SGPT dan SGOT Tikus Putih Jantan

Perlakuan	Kadar SGPT (mU/mL)	Kadar SGOT (mU/mL)
Kontrol normal	23,25 ± 7,45	29 ± 7,61
Kontrol positif	25 ± 2,94	30 ± 3,74
Kontrol negatif	50,75 ± 8,77	59,5 ± 10,36
Dosis 1 (50 mg/200 g BB)	18 ± 4,39	23,5 ± 3,87
Dosis 2 (100 mg/200 g BB)	21 ± 4,96	26,26 ± 4,78
Dosis 3 (200 mg/200 g BB)	23,5 ± 3,11	29,75 ± 1,71

Tabel 5.
Rata-rata Diameter Vena Sentralis

Perlakuan	Diameter rata-rata vena sentralis (µm)
Kontrol normal	0,3425 ± 0,015
Kontrol positif	0,32 ± 0,029
Kontrol negatif	0,7125 ± 0,043
Dosis 1 (50 mg/200 g BB)	0,4575 ± 0,047
Dosis 2 (100 mg/200 g BB)	0,4375 ± 0,012
Dosis 3 (200 mg/200 g BB)	0,335 ± 0,042

Pengukuran kadar SGPT dan SGOT menggunakan Spektrofotometer Klinikal. Dari data yang diperoleh, dilakukan uji homogenitas dan normalitas (*Kosmogorov-Smirnov*) didapat nilai $P > 0,05$ yang memberi kesimpulan bahwa data terdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya dilakukan uji ANOVA satu arah didapat $P < 0,05$, hasil tersebut menunjukkan adanya efektivitas ekstrak biji petai sebagai hepatoprotektor. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan yang ada, analisa dilanjutkan dengan uji Tukey HSD. Dari tabel 4 di atas untuk kontrol negatif didapatkan hasil kadar SGPT ($50,75 \pm 8,77$ mU/mL) dan SGOT ($59,5 \pm 10,36$ mU/mL). Hasil uji statistik menunjukkan perbedaan yang bermakna dengan semua kelompok perlakuan. Hal ini disebabkan karena kontrol negatif hanya diberi induksi dengan CCl₄ tanpa pemberian obat. Pada saat pemberian CCl₄ sel hati menjadi rusak. CCl₄ di dalam hati dimetabolisme fase 1 menjadi CCl₃ yang bereaksi dengan O₂ menjadi CCl₃O₂ yang bersifat radikal bebas, senyawa ini memperoksidasi rantai asam lemak dari membran sel yang menyebabkan perubahan permeabilitas membran sel hati dan membran sel endotel pada vena sentralis. Setelah terjadi peroksidasi, rantai membran sel lisis menjadi rusak, sehingga enzim SGPT dan SGOT yang terdapat

didalam sel hati keluar dan masuk ke dalam sirkulasi darah, yang menyebabkan peningkatan kadar SGPT dan SGOT di dalam darah. Pengujian dilanjutkan dengan pengukuran rerata diameter vena sentralis. Pengukuran rerata diameter vena sentralis dilakukan dengan mikroproyektor di dalam ruang gelap. Dari data yang diperoleh, dilakukan uji homogenitas dan normalitas (*Kosmogorov-Smirnov*) didapat nilai $P > 0,05$ yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya dilakukan uji ANOVA satu arah didapat $P < 0,05$, hasil tersebut menunjukkan adanya efektivitas ekstrak biji petai sebagai hepatoprotektor. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan yang ada dilanjutkan dengan uji Tukey HSD.

Dari tabel 5 didapatkan hasil rerata vena sentralis kontrol negatif ($0,7125 \pm 0,043 \mu\text{m}$), dosis 1 ($0,4575 \pm 0,047 \mu\text{m}$), dan dosis 2 ($0,4375 \pm 0,012 \mu\text{m}$). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara kontrol negatif, dosis 1, dan dosis 2 dengan kontrol normal, kontrol positif, dan dosis 3. Dapat disimpulkan bahwa dosis 3 ($0,335 \pm 0,042 \mu\text{m}$) memiliki efektivitas yang sama dengan kontrol normal ($0,3425 \pm 0,015 \mu\text{m}$) dan kontrol positif ($0,32 \pm 0,029 \mu\text{m}$). Dari hasil semua data yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstrak biji petai memiliki efektivitas sebagai hepatoprotektor dengan dosis efektif dosis 3 (200 mg/200 g BB), hal ini didukung dengan data statistik rerata diameter vena sentralis yang menunjukkan tidak adanya perbedaan antara dosis 3 dengan kontrol normal dan kontrol positif, sedangkan dosis 1, dosis 2, dan kontrol negatif terdapat perbedaan yang bermakna.

Hasil Histopatologi Hati

Gambar 1. Kontrol normal (a. vena sentralis ; b. sinusoid)

Gambar 2. Kontrol positif (a. vena sentralis ; b. sinusoid)

Gambar 3. Kontrol negatif (a. Vena sentralis ; b. sinusoid)

Gambar 4. Dosis 1 (a. vena sentralis ; b. sinusoid)

Gambar 5. Dosis 2 (a. vena sentralis; b. sinusoid)

Gambar 6. Dosis 3 (a. vena sentralis ; b. sinusoid)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa biji petai (*Parkia speciosa* Hassk) memiliki efektivitas sebagai hepatoprotektor dengan dosis efektif 200mg/200g BB. Hal ini ditunjukkan dari hasil data statistik rerata kadar SGPT dan SGOT yang menunjukkan tidak adanya perbedaan antara dosis 3 ($23,5 \pm 3,11$) untuk SGPT dan ($29,75 \pm 1,71$) untuk SGOT dengan kontrol normal ($23,25 \pm 7,45$) untuk SGPT dan ($29 \pm 7,61$) untuk SGOT serta kontrol positif ($25 \pm 2,94$) untuk SGPT dan ($30 \pm 3,74$) untuk SGOT, dan didukung dengan data statistik rerata diameter vena sentralis yang menunjukkan tidak adanya perbedaan bermakna antara dosis 3 ($0,335\mu\text{m} \pm 0,042$) dengan kontrol normal ($0,3425\mu\text{m} \pm 0,015$) dan kontrol positif ($0,32\mu\text{m} \pm 0,029$), sedangkan pada dosis 1 ($0,4575\mu\text{m} \pm 0,047$), dosis 2 ($0,4375\mu\text{m} \pm 0,012$), dan kontrol negatif ($0,7125\mu\text{m} \pm 0,043$) terdapat perbedaan yang bermakna. Rekomendasi yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap toksisitas ekstrak biji petai untuk dapat diimplementasikan sebagai obat dan perlu diusahakan agar dosis yang digunakan dapat diperkecil dengan cara fraksinasi, isolasi zat aktif isolasi dan semisintesis.

REFERENSI

1. Anief, M. 2000. Ilmu Meracik Obat. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm. 168-169
2. Baradero M, et al. 2008. Klien Gangguan Hati : Seri Asuhan Keperawatan. ECG. Jakarta. Hlm.1-19
3. Departemen Kesehatan RI. 2000. Parameter Standar Umum Ekstrak. Jakarta: Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. Hlm.11-13
4. Departemen Kesehatan RI, 1995. Farmakope Indonesia. Edisi IV. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta. Hlm 175
5. Depkes RI. 2008. Farmakope Herbal Indonesia. Edisi 1. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Hlm 170
6. Eroschenko V. P. 2003. Atlas Histology di Fiore dengan Korelasi Fungsional Edisi 9. Jakarta: EGC. Hlm. 215.
7. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1995. Farmakologi dan Terapi. Jilid IV. Departemen Farmakologi dan Terapeutik FKUI. Jakarta. Hlm. 777
8. Hadi, S. 2002. Hepatologi. Mandar Maju. Jakarta. Hlm.174-195

8. Hardiningtyas Safrina D, dkk. 2014. Aktivitas Antioksidan dan Efek Hepatoprotektif Daun Bakau Api-Api Putih. JPHPI. Vol. 17, no. 1, Hlm. 80
9. ITIS Standart Report Parkia speciosa Hassk Taxonomic Hierarchy. http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=506261. Diakses 26 Maret 2016
10. Joniada, I Made. 2011. Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun Katuk (*Sauropus androgynous* L.) Sebagai Hepatoprotektor Pada Mencit Yang di Induksi Parasetamol. Skripsi. Fakultas Farmasi Universitas Jember, Jember. Hlm. 39
11. Kamisah, Y. et al. 2013. "Parkia speciosa Hassk : A Potential Pytomedicine". Journal International. Volume 2013. Page 9
12. Klaassen D. Curtis. 2007. Dasar Farmakologi Terapi. Edisi 10. Terjemahan : Tim Alih Bahasa sekolah farmasi ITB. Buku Kedokteran EGC. Jakarta. Hlm.1850
13. Pahalaning W. I 2007. Uji Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak Etanol 70% Biji Petai (*Parkia spesiosa* Hassk) Secara In Vitro. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/2672>. Diakses 25 Mei 2016
14. Priyanto, 2015. Toksikologi. LESKONFI, Depok. Hlm.98-101
15. Sadikin M. 2002. Biokimia Enzim. Widya Medika, Jakarta. Hlm. 287-309
16. Setiadi. 2007. Anatomi dan Fisiologi Manusia. Edisi I. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm. 80-81
17. Steven A, Lowe J. 2005. Human Histology 3rd Edition. Philadelphia: Elsevier Saunders. Hlm.230. 14
18. Tanjaya, Arifin. 2015. Uji Aktivitas Antiinflamasi dan Antipiretik Ekstrak Etanol Biji Petai (*Parkia speciosa* Hassk) Pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar. Naskah Publikasi. Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Pontianak